

## TD VII

[7.2]  $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{y}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$  calculer  $f_{xy}(0, 0)$ ,  $f_{yx}(0, 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x} \quad \text{pour } x \neq 0 \quad \text{d'où } \frac{\partial f}{\partial x} \text{ existe sur } \mathbb{R}^2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{h^2 \sin 0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos \frac{y}{x} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$= x^2 \left[ \frac{y}{x} \right]' \sin \left( \frac{y}{x} \right) = \frac{x^2}{x} \cos \left( \frac{y}{x} \right) = x \cos \frac{y}{x} \quad \text{d'où } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existe sur } \mathbb{R}^2$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \frac{h - 0}{h} = 1$$

[7.3] Vérifier que  $f_{xx} + f_{yy} = 0$

1)  $f(x, y) = e^x \sin y$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (\sin y) e^x \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^x \cos y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (\sin y) e^x \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -e^x \sin y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^x \sin y - e^x \sin y = 0$$

2)  $f(x, y) = x^3 - 3x^2 y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -6xy$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x - 6x = 0$$

3)  $f(x, y) = x^4 - 6x^2 y^2 + y^4$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 12x^2 y^2 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -12x^2 y + 4y^3$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 12y^2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -12x^2 + 12y^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad \square$$

[7.4] Écrire la différentielle seconde en  $(0, 0)$  de  $f(x, y) = e^x \sin y$

Rappel:  $d^2 f_a(h) = h^T H_a(h) h \quad h = (x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \sin y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^x \cos y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^x \sin y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^x \cos y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -e^x \sin y$$

$$H_a(h, h) = \begin{pmatrix} e^h \sin h_1 & e^h \cos h_1 \\ e^h \cos h_1 & -e^h \sin h_1 \end{pmatrix} = e^h \begin{pmatrix} \sin h_1 & \cos h_1 \\ \cos h_1 & -\sin h_1 \end{pmatrix}$$

$$d^2 f_a(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin h_1 & \cos h_1 \\ \cos h_1 & -\sin h_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^T$$

$$= e^h (x \sin h_1 + y \cos h_1, x \cos h_1 - y \sin h_1) (x, y)^T$$

$$= e^h (x^2 \sin h_1 + xy \cos h_1 + xy \cos h_1 - y^2 \sin h_1)$$

$$= e^h (x^2 \sin h_1 + 2xy \cos h_1 - y^2 \sin h_1)$$

$$\boxed{d^2 f_{(0,0)}(x, y) = 2xy}$$

[7.5] 2)  $q_2(x, y) = 2x^2 + 4xy + 3y^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 4 = 2 > 0$

$$3) q_3(x, y) = x^2 + 4xy + 4y^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2 \cdot 2 = 0 \quad \begin{cases} \text{semi-définie} \\ \text{posif} \end{cases}$$

$$4) q_4(x, y) = 3xy \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} < 0 \quad \begin{cases} \text{indéfinie} \end{cases}$$

$$5) q_5(x, y) = -2x^2 + 2xy - 5y^2 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = 10 - 1 = 9 > 0 \quad \begin{cases} \text{Def négative} \\ \text{Def posif} \end{cases}$$

$$\text{Rappel: Critère de Sylvester: } \begin{cases} \text{def pos si tous les mineurs sont al. posif} \\ \text{def neg si ils suivent le signe de } (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \end{cases}$$

**Exercice 7.6** — Classifier, en fonction de  $\alpha$ , la forme quadratique représentée par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 + \alpha & \alpha \\ 1 & 2\alpha \end{pmatrix}$$

**Correction 7.6** On observe que  $A$  ne représente pas une forme quadratique car la matrice n'est pas symétrique dans le cas général :

$$Q(x, y) = (x \ y) A (x \ y)^T = ((1 + \alpha)x + y \ \alpha x + 2\alpha y)(x \ y)^T = (1 + \alpha)x^2 + (1 + \alpha)xy + 2\alpha y^2$$

Ce qui nous permet d'écrire la véritable forme quadratique :

$$\tilde{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2(1 + \alpha) & (1 + \alpha) \\ (1 + \alpha) & 4\alpha \end{pmatrix}$$

On utilise alors le critère de Sylvester et on étudie les cas de semi-définition :

—  $m_1 > 0 \Leftrightarrow \alpha > -1$  et  $m_2 = \det(\tilde{A}) > 0 \Leftrightarrow 6\alpha + 7\alpha^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)(7\alpha - 1) > 0 \Rightarrow \alpha > \frac{1}{7}$ .

On a donc  $\tilde{A}$  définie positive si  $\alpha > \frac{1}{7}$ .

—  $m_1 < 0 \Leftrightarrow \alpha > -1$  et  $m_2 = \det(\tilde{A}) > 0 \Leftrightarrow 6\alpha + 7\alpha^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)(7\alpha - 1) > 0 \Rightarrow \alpha < \frac{1}{7}$ .

On a donc  $\tilde{A}$  définie négative si  $\alpha < -1$ .

— Si  $\alpha = -1$ ,  $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$  qui est semi-définie négative (son spectre est  $0\{, -2\}$ ).

Si  $\alpha = \frac{1}{7}$ ,  $\tilde{A} = \frac{2}{7} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  qui est semi-définie positive (son spectre est  $0\{, \text{tr}(\tilde{A}) = \frac{10}{7}\}$ ).

—  $\tilde{A}$  est indéfinie sinon ( $-1 < \alpha < \frac{1}{7}$ ).

$$7.7) \quad 1) \quad f_1(x, y) = xy \exp(-x^2 - y^2)$$

① On cherche des candidats extrêmes.  $\rightarrow$  Théorème du Fermat

$$\begin{aligned} \nabla f_1(x, y) &= \begin{cases} y \exp(-x^2 - y^2) + xy(-2x) \exp(-x^2 - y^2) \\ x \exp(-x^2 - y^2) + xy(-2y) \exp(-x^2 - y^2) \end{cases} \\ &= \begin{cases} y \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2) \\ x \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\nabla f_1(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2) = 0 \\ x \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1 - 2x^2) = 0 \\ x(1 - 2y^2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ ou } \frac{1}{2} = x^2 \\ x = 0 \text{ ou } \frac{1}{2} = y^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ ou } x = \sqrt{\frac{1}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{1}{2}} \\ x = 0 \text{ ou } y = \sqrt{\frac{1}{2}} \text{ ou } y = -\sqrt{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x^2} &: y(-2x) \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2) + y \exp(-x^2 - y^2)(-4x) \\ &= (-2x)y \exp(-x^2 - y^2)[1 - 2x^2 - 2] \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 f_1}{\partial y^2} = x(-2y) \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2) + x \exp(-x^2 - y^2)(-4y)$$

$$= (-2y)x \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2 - 2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f_1}{\partial x \partial y} &= (1 - 2x^2) \exp(-x^2 - y^2) + y(1 - 2x^2)(-2y) \exp(-x^2 - y^2) \\ &= \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2)(1 - 2y^2) \end{aligned}$$

Pour  $(0, 0)$ :  $\frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$  indéfinie  $\rightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = -1 \end{cases}$

Rappel: la matrice Hémienne s'écrit comme  $\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = f_{xx}(x) + 2f_{xy}(x)xy + f_{yy}(x)$   
pour  $f$  symétrique